

Contexte général

Contexte du don d'organes

- EME ou DDAC
- Mort violente et non attendue (AVC, traumatisme crânien, anoxie cérébrale)
- Etat de sidération chez les proches

Définition du deuil compliqué

Plus de 6 mois après le décès (DSM V)

Prévalence en population générale : 2,4 à 6,7 %

En cas de mort violente : de 12,5 à 78%

Évaluation : Inventory of complicated grief (ICG) scale >25

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

CLINICAL PRACTICE

Caren G. Solomon, M.D., M.P.H., Editor

Complicated Grief

M. Katherine Shear, M.D.

Cause of death	Author (year)	N	Prevalence (%)	Time since death (years)	Measurement
Violent death					
Bosnian conflict	Momartin et al (2004) ¹¹	126	31.0	5	CBI
Rwandan genocide	Schaal et al (2009) ¹²	40	12.5	10	PG-13
September 11th attacks	Neria et al (2007) ¹³	704	43.2	2.5-3.5	ICG
Homicide and traffic accident	Nakajima et al (2009) ¹⁴	74	21.9	7.8	SITG
Suicide	Dyregrov et al (2003) ¹⁵	128	78.0	1.3	ICG
Accident	Dyregrov et al (2003) ¹⁵	68	78.0	1.2	ICG


Matériel et Méthode

- Étude observationnelle, prospective dans plusieurs réanimations de l'hôpital Pellegrin
- Décembre 2014 à janvier 2016
- Echelles : ICG (complicated grief) IDS-SR (dépression) PCLS (PTSD) 1 mois, 3 mois et 6 mois
- 2 groupes de proches de donneurs inclus:
 - EME (25 donneurs and 81 proches)
 - Témoins (pas de prélèvement 10 patients et 27 proches)

Résultats

- Deuil compliqué très haut
55.2 EME vs 62,5
- Pas de différences statistiques
- Pas de facteurs de risques identifiés
- effectif étudié faible, perdus de vue

	Donneurs (n=25)	Témoins (n=10)	p
Age (Années)			0,8
Médiane [IQR]	54 [40-67]	62 [21-77]	
Extrêmes	8-85	10-81	
Sexe, n (%)			0,5
Hommes	13 (52)	7 (70)	
Femmes	12 (48)	3 (30)	
Etiologie, n (%)			
Médicale	11 (44)	3 (30)	
Traumatique	14 (56)	7 (70)	
Lieu du décès, n (%)			0,003
Urgences-déchocage	13 (52)	10 (100)	
Réanimation *	12 (48)	0	
Délai entre l'admission et le décès (Heures)			0,03
Médiane [IQR]	38 [25-74]	15 [3-45]	
Extrêmes	6-217	0,2-71	



Discussion

- Première étude française évaluant le deuil compliqué chez les proches de donneurs avec ICG
- 55% de deuil compliqués



Complicated grief after death of a relative in the intensive care unit

Kentish-Barnes N et al. Eur Respir J. 2015 Jan 22;

- Etude prospective dans 41 réanimations en France
- Deuil compliqué évalué par ICG
- 475 patients, 282 proches évalués à 6 mois (59%)

147 proches => ICG > 25
52,1 %

- Deuil compliqué très fréquent en cas de don d'organes
- Pas de surrisque lié au don
- Intérêt majeur à détecter cette pathologie : risque de morbidité +++